

ChemTica Internacional, S.A.

ChemTica Cylas formicarius Lure 86.5 CB

Feromona-Biologico-Cylas

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Composición química: | p/p |
| Z3-Dodecenyl-E2-butenate | 86.5 mgr |
| Ingredientes inertes | 13.5 mgr |
| Total | 100.0 mgr |

Contiene 86.5 microgramos de butenoate por capsula

Contenido neto: 10 Feromonas / sobre

PRECAUCION

Antidoto: No tiene

Fabricado por:
ChemTica Internacional, S.A.
Zeta Industrial Park, La Valencia
Heredia, Costa Rica

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION, MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS.

EN CASO DE INTOXICACION LLEVE EL PACIENTE AL MEDICO Y DELE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO.

SINTOMAS DE INTOXICACION: No se han presentado.

PRIMEROS AUXILIOS:

Ingestión: No aplica **Contacto con los ojos:** Lave los ojos inmediatamente, dejando correr el agua durante 15 minutos, mantenga los ojos abiertos. **Contacto con la piel:** Lave abundantemente el área contaminada con agua y jabon. **Inhalacion:** No aplica **NUNCA DE HA BEBER NI INDUZCA AL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONCIENCIA.**

Tratamiento y antidoto: No tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático.

CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS ANTES DE COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS, CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.

AVISO DE GARANTÍA

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase corresponde a la descripción química anotada en la etiqueta, lo cual es adecuado para los propósitos aquí señalados, siempre y cuando se sigan las instrucciones de la etiqueta y se use bajo condiciones normales. No se extiende ningún tipo de garantía, expresa o implícita, cuando no se sigan las instrucciones de la etiqueta o cuando las condiciones de uso sean anormales, en cuyo caso el comprador asume los riesgos de manejo y uso.

| PAÍSES donde se encuentra registrado | No. Registro |
|---|---------------------|
| GUATEMALA | |
| BELICE | |
| EL SALVADOR | |
| HONDURAS | |
| NICARAGUA | |
| COSTA RICA | |
| PANAMA | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 2993 |

Numero de lote:

Fecha de Fabricación: **Octubre 2011**

Fecha de vencimiento: **Octubre 2013**

Importado y distribuido por:

SOLAGRO, S.R.L

Calle Miguel Angel Garrido # 11
Los Prados, Santo Domingo, Republica Dominicana
TEL. (809) 473-4044 Fax: (809) 546-5677

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS.

ChemTica Cylas formicarius Lure 86.5 CB

Feromona-Biologico-Cylas

ANTIDOTO: No tiene.

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DANOS A LOS OJOS Y LA PIEL POR EXPOSICION

NO ALMACENAR EN CASA DE HABITACION

MANTENGASE ALEJADO DE LOS NINOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMESTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

USO AGRONOMICO:

Modo de acción: El ciclo de vida del *Cylas formicarius* requiere de uno a dos meses. El adulto prefiere vivir en las hojas, alimentándose de todas las partes de la planta de la batata, preferiblemente en la noche. Los huevos son depositados en pequeñas cavidades hechas por la hembra con su boca en el tubérculo de la batata y tapado con sus heces. Cuando el huevo se rompe emerge la larva directamente en el tubérculo de la planta.

Control: Mas de un 90 % de las larvas se encuentran en los primeros 15 cms del tubérculo. Las feromonas muestran un gran control para el monitoreo de la población adulta. El insecto adulto responde a concentraciones bajas de feromona, y aparentemente son atraídas a más de 280 metros de la fuente de la feromona.

Equipo de aplicación: Se coloca manualmente en las estaciones para colocar las feromonas.

Forma de preparación de la mezcla: Viene listo para aplicar.

Recomendaciones de uso:

Cultivo: Batata (*Ipomea batata*)

Plaga: Piogan de la batata (*Cylas Formicarius*)

Dosis recomendadas:

La feromona es transportada en una goma. Usar la feromona a una densidad de 4 trampas por 0.1 hectárea y/o cada 4 tareas. Esto reduce el daño en un 65 % de esta plaga.

En envase plástico de galón o botellas de dos litros transparentes, hacer aperturas a los lados, colgar la feromona de la tapa usando un hilo. Colocar un poco de agua con un detergente suave en el fondo del envase, donde caerán los insectos.

En un solo día una trampa con feromona puede atrapar varios miles de insectos machos.

Puede utilizarse en combinación con un insecticida, aplicado al surco de la siembra de las abanas de batata en forma de drenaje.

Intervalo de aplicación: Revisar las estaciones con las feromonas semanalmente. La feromona se mantiene activa durante dos a tres meses.

Intervalo entre la última aplicación y la cosecha: No aplica

Intervalo de reingreso al área tratada: No aplica

Fitotoxicidad: No es fitotóxico.

Compatibilidad: Se aplica solo y no se debe mezclar con ningún pesticida.

Precaución y advertencia de uso:

Utilice guantes al momento de la colocación de las feromonas en las estaciones.

Almacenamiento y transporte:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASA DE HABITACION MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO, BANARSE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA

SINTOMAS DE INTOXICACION: No se han presentado síntomas de intoxicación.

PRIMEROS AUXILIOS:

Ingestión: No aplica **Contacto con los ojos:** Lave los ojos inmediatamente, dejando correr el agua durante 15 minutos, mantenga los ojos abiertos. **Contacto con la piel:** Lave abundantemente el área contaminada con agua y jabon.

Inhalacion: No aplica

Tratamiento y antídoto: No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TRATAMIENTO MEDICO: No tiene antídoto específico.

CENTRO NACIONALES DE INTOXICACION:

Hospital Dr. Luis Aybar. Tel. 684-3478/684-3672

Hospital Dr. Francisco E. Moscoso. Tel. 681-2913/681-6922

MEDIDAS DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE:

No contaminar fuentes de agua (superficiales y subterráneas).

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISENADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

PAÍSES donde se encuentra registrado

No. Registro

GUATEMALA

BELICE

AVISO DE GARANTÍA

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase corresponde a la descripción química anotada en la etiqueta, lo cual es adecuado para los propósitos aquí señalados, siempre y cuando se sigan las instrucciones de la etiqueta y se use bajo condiciones normales. No se extiende ningún tipo de garantía, expresa o implícita, cuando no se sigan las instrucciones de la etiqueta o cuando las condiciones de uso sean anormales, en cuyo caso el comprador asume los riesgos de manejo y uso.

Fabricado por:

ChemTica Internacional, S.A.

San José, Costa Rica

Importado y distribuido por:

SOLAGRO, S.A.

Calle Miguel Angel Garrido # 11 Los Prados

Santo Domingo, Republica Dominicana

TEL. (809) 473-4044 Fax: (809) 546-5677

Numero de registro

REPUBLICA DOMINICANA

2993